

不快害虫用殺虫剤

アース・スミラブ 発泡錠 M1

有効成分 : 1錠(1g)中ピリプロキシフェン5mg
効能又は効果 : ユスリカ幼虫及びチョウバエ幼虫の駆除
性状 : 灰白色の錠剤
包装 : 400錠箱×10/梱

特長

- (1) 昆虫成長制御剤(IGR)ピリプロキシフェンの作用によりユスリカやチョウバエの変態を阻止し、成虫の発生を抑える薬剤です。
- (2) 1錠1gのコンパクトな錠剤で、雨水ます、水溜り、側溝、浄化槽などから発生する不快害虫を源から絶つ薬剤です。
- (3) 標的以外の生物に対して安全性の高い薬剤です。

| | ■急性毒性(製剤)LD ₅₀ 値(mg/kg) | | ■魚毒性(製剤)TL _m 値(ppm) | |
|-----|------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| | 経口 | 経皮 | コイ(48時間) | ミジンコ(24時間) |
| マウス | >5,000 | >6,000 | 232 | >1,000 |
| ラット | >4,000 | >6,000 | | |

- (4) 浄化槽内の活性汚泥菌に実用濃度では悪影響を及ぼしません。

効果

ユスリカ及びチョウバエ成虫の発生を約1カ月間抑え続けます。

用法及び用量

| 適用害虫 | 適用場所 | 使用量 |
|---------|------------------------|---|
| ユスリカ幼虫 | 雨水ます、水槽、水溜り 側溝、下水など | 水量50~80L当たり1錠を 投入する。 |
| チョウバエ幼虫 | 浄化槽、汚水槽 | 汚水表面500cm ² 当たり1錠を 適量の水に溶かして散布する。 |

処理方法

■ ユスリカ ■

流れのない場合は、本品を用法及び用量に従ってバケツ等で溶かし、ひしゃく、じょうろ等で散布してください。

流れのある場合は、その水域の1時間流水量1トン当たり13～20錠を投入してください。

1時間流水量(トン)＝川幅(m)×水深(m)×流速(m/秒)×3,600

■ チョウバエ ■

汚水表面500cm²当たり1錠を1～2Lの水に溶かし、スカム(汚水表面の汚泥)上など幼虫の生息している場所に散布してください。

使用上の注意

【使用に際しての注意】

- (1)使用前に取扱説明書をよく読んで、十分理解してから使用すること。
- (2)定められた用法及び用量を厳守して使用すること。
- (3)環境を汚染しないよう乱用を避けること。また井戸、地下水などを汚染する恐れのある場所や蜜蜂、蚕(桑)、水棲生物などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないこと。
- (4)アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい特異体質の人は、薬剤の処理作業には従事しないこと。

【使用中又は使用後の注意】

- (1)使用に際しては、保護具(手袋、マスクなど)を着用し、身体の露出部を少なくして薬剤に触れないようにすること。
- (2)使用後は必ず、また薬剤が皮膚に付いたときは直ちに、石けんと水でよく洗うこと。
万一、薬剤が口、目などに入った場合には、直ちに水でよく洗い流すこと。
- (3)万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、医師の診療を受けること。
医師の診療を受ける際には、本剤が昆虫成長制御剤であることを告げること。
- (4)作業時の衣服は他の衣服と区別して洗濯し、保護具も洗剤を使ってよく洗うこと。
- (5)使用済みの空容器は、適切に処分すること。

【保管上の注意】

- (1)本剤は開封したまま放置していると、空気中の水分を吸収して発泡力がおとろえるので、使用後、残った薬剤は元の容器に密閉し、他のものと区別して保管すること。
- (2)幼小児の手の届かない、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所に保管すること。